

"L'Echange", Revue Linnéenne

Numéro spécial

M. PIC, Rédacteur

Opuscula martialis

VII

(2 Juin 1942)

MOULINS

"LES IMPRIMERIES RÉUNIES"

15, RUE D'ENGHIEN, 15



24/10/1975 - 10/11/1975



Les espèces et variétés décrites dans le présent fascicule se trouvent dans ma collection.

Dorcadion varievittatum n. sp. [Cerambyc.]. Oblongus, nigro aut griseo pubescens, niger, antennis ad basin pedibusque rufis; thorace medio anguste et lateraliter late griseo pubescente, supra externe nigro et fulvo pubescente; elytris parum elongatis, subarcuatis, postice attenuatis, humeris paulo prominulis, his griseo marginatis, in singulo externe, vitta humeralis integra et vitta interna abbreviata, in disco et interne diverse nigro vittatis, inter vittas fulvo pubescentibus. L. 13 m. Russie M^{re}. — Espèce caractérisée par le revêtement élytral particulier fait de bandes diverses alternées. A placer près de *Linderi* Trm.

D. Mostarense n. sp. Oblongo-elongatus, supra dense fulvo pubescens et albo vittatus, infra sat dense albo pubescente, niger, antennis nigris, ad basin rufis, pedibus rufis, tarsis nigris; capite intus fulvo, medio longe albo vittato et anguste sulcato; thorace breve et lato, medio anguste albo vittato; elytris sat elongatis, subarcuatis, postice attenuatis, humeris sat prominulis, albo marginatis, in singulo externe albo bivittatis; vitta humeralis fere integra, vitta interna reducta, paulo obliquata. Long. 14 m. Mostar. — Voisin de *7-lineatum* K., forme plus allongée, bande discale moins droite, se dirigeant un peu obliquement vers la bande suturale.

D. divisum v. n. thebesianum. Lineis albis interna et humeralis elytrorum postice junctis. Thèbes.

D. atticum v. n. luteovittatum ♂. Entre les bandes blanches humérale et dorsale jointes largement aux extrémités apparaît une courte bande formée de poils jaunes. Eubée.

D. 7-lineatum v. n. rufoapicale. Forme oblongue allongée, élytres à revêtement noir avec bordure, bande humérale et dorsale jointes postérieurement grises, sommet roux. Salonique.

D. subobesum n. sp. Oblongo-subovalis, postice attenuatus, parum convexus, nitidus, niger, non dense sed uniformiter griseo-luteo pubescens ♀, sæpe fere glaber ♂ ; thorace medio parum distincte albo lineato, fortiter non dense punctato ; elytris latis, sat brevibus, lateraliter arcuatis, postice attenuatis, sat fortiter punctatis, externe carinatis, albo cinctis, linea humeralis grisea parum distincta aut oblitterata, membris nigris, L. 11-14 m. Amasia. Espèce à placer près de *pedestre* Poda, caractérisée par sa forme robuste et ses membres foncés.

D. sericatum v. n. subreductum. Oblongus, sat robustus, supra dense fulvo, pro parte indistincte nigro pubescens, elytris albo marginatis, linea humeralis integra ornatis, membris rufis. Asie M^{re}. — Caractérisé par son revêtement et les antennes plus claires.

Le **sericatum v. Perroudi**, de Crimée, a un revêtement général fauve en dessus avec quelques taches noires aux élytres ; ceux-ci ont, en plus d'une bordure et d'une bande humérale, une bande discale assez longue blanchâtre, le 1^{er} article des antennes et les pattes sont rousses.

D. solyzinosum n. sp. Oblongo-subovatus, sat convexus, niger, capite et thorace griseo et fulvo pubescentibus, fortiter punctatis, elytris nigro pubescentibus, externe luteis, in singulo late albo trilineatis : linea humeralis, linea interna elongata, postice attenuata, linea suturalis et prope suturam anguste et interrupte griseo vittatis, membris rufis. L. 11 m. Solyzino. — A placer près de *Lederi* Kr.

D. Kruperi v. thessalicum mihi, de Thessalie, a la bande dorsale séparée de l'humérale à l'extrémité.

Isolemidia brevenotata n. sp. [Cler.]. Elongatus, nitidus, fere glaber, rufus, pro parte testaceus, pectore brunnescente, elytris ad medium et postice reducte brunneo notatis, his minute punctatis, pro parte granulatis. L. 5,5 m. Montevideo. — Voisin de *punctata* Pic, thorax moins court et plus clair, élytres à sculpture et dessins différents.

I. angustata v. n. olivaceonotata. Tête presque entièrement rousse, thorax foncé, élytres flaves ornés, avant et après le milieu, d'une grande macule olivâtre métallique. Brésil.

Plocamocera latefasciata n. sp. [Cler.]. Minutus, elongatus, nitidus, parum pubescens, capite pro majore parte rufo, thorace nigro, rufo cincto, medio transverse impresso ; elytris parum latis et elongatis, ad basin testaceis et brunneo notatis, postice nigris, infra medium late testaceo sinuate fasciatis, ante apicem griseo fasciatis, his sat fortiter et irregulariter punctatis, antennis ad basin pedibusque testaceis. L. 4 m. Guyane. — Diffère des espèces décrites par la base des élytres plus claire que le reste de ces organes avec une large fascie post-médiane.

P. impressicollis n. sp. Elongatus, parum latus, nitidus, paulo hirsutus, niger, capite pro parte thoraceque rufis, illo ad medium externe late impresso ; elytris dense punctatis, nigris, ad basin rufo-testaceo notatis, griseo et testaceo sinuate trifasciatis, fasciis posticis paulo approximatis ; pedibus pro parte rufis. L. 6 m, Brésil. — Plus large et plus grand que le précédent, avec les fascies des élytres à revêtement gris pubescent.

Falzocalochromus n. g. [Lycide]. Capite non ros-


trato, mandibulis gracilibus et longissimis, oculis prominulis ; antennis opacis, pilosis, subfiliformibus, apice attenuatis ; thorace breve et lato, antice subarcuato, postice sinuato, lateraliter valde excavato ; elytris multi costulatis, intervallis granulosis ; metasternum valde elevatum, coxis posticis approximatis. — Ce genre, établi pour l'espèce nouvelle suivante, caractérisé par la particulière structure de l'avant-corps, peut se placer près de *Calochromus* Guer.

F. ruficollis n. sp. Parum nitidus, breve fusco pubescens, nigro-piceus, thorace et pectore rufescentibus ; capite thoraceque minute punctatis ; elytris antice angustioribus, ad humeros impressis et paulo rufescentibus. L. 8 m. Presqu'île Malaise.

Calochromus robusticollis n. sp. [Lycide]. Elongatus, sat latus, nigro-cyaneus, supra aurantiaco pubescens ; antennis sat depressis, pro parte impressis ; thorace lato, antice attenuato, postice triimpresso ; elytris multi et distincte costatis. L. 15 m. Thibet. — Voisin de *ruber* W., plus robuste avec le thorax différent.

C. atriceps n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace elytrisque aurantiacis ; antennis elongatis, sat gracilibus ; thorace breve et lato, lateraliter et antice fere recto, medio sulcatulo ; elytris multi et minute costatis. L. 17 m. Iles Sonde. — Voisin de *Gorhami* Pic, en diffère par la tête noire.

C. pectinicornis n. sp. Elongatus, parallelus, niger, vage cærulescens, thorace elytrisque aurantiacis, his apice parum late nigris ; antennis depressis, longe pectinatis ; thorace parum lato, antice attenuato, medio longe et anguste sulcato, lateraliter impresso ; elytris pro parte minute costulatis. L. 15 m. Java. — Voisin de *subflabelatus* Pic, antennes et thorax différents.



C. Wittmeri n. sp. Elongatus, postice paulo latior, nigro-cyaneus, thorace elytrisque aurantiacis, his apice breve nigris ; antennis depressis ; thorace parum breve, antice attenuato, medio paulo elevato et postice valge sulcato, lateraliter impresso ; elytris pro parte et diverse costulatis. L. 19 m. Bandar. — Diffère de *impressipennis* Pic par la forme du thorax et les élytres un peu élargis postérieurement.

C. reductus n. sp. Elongatus, nitidus, niger, thorace elytrisque aurantiacis, his apice breve nigris ; antennis elongatis, sat gracilibus ; thorace sat breve, transverso, antice paulo attenuato, medio longe sulcato, lateraliter subarcuate impresso ; elytris parum elongatis, multi et regulariter costatis. L. 10 m. Australie. — Diffère de *distinguendus* Frm. par les élytres brièvement noirs au sommet.

Thaptor multistriatus n. sp. [Anob.]. Oblongus, antice et postice attenuatus, subnitidus, parum pubescens, dense punctatus, rufus, élytris multi striatis, striis sat fortiter punctatis. L. 2 m. Cayenne. — Espèce très caractérisée par ses élytres striés sur le dessus en plus des côtés.

T. robustus n. sp. Oblongus, sat latus, parum nitidus, minute griseo-holosericeo pubescens, minute sat dense punctatus, niger ; thorace breve, antice attenuato ; elytris infra humeros depressis, lateraliter unistriatis. L. 4,5-5 m. Guatemala. — Peut se placer près de *breve-collis* Sol., caractérisé par son aspect peu brillant.

T. minutissimus n. sp. Subovatus, antice attenuatus, longe griseo pubescens, nitidus, minute punctatus, elytris latis et brevibus, externe reducte bistriatis. L. 1,5 m. Brésil. — Très caractérisé par sa forme jointe à sa petite taille.

T. bolivianus n. sp. Oblongus, griseo-holosericeo pubescens, nitidus, minute punctatus, rufescens, pro parte obscurus ; thorace breve, antice paulo attenuato ; elytris sat brevibus, postice attenuatis, lateraliter unistriatis. L. 2 m. Bolivie. — Peut se placer près de *Dejeani* Pic.

T. peruvianus n. sp. Oblongus, antice et postice attenuatus, convexus, nitidus, minute punctatus, griseo-luteo pubescens, nigro-piceus, capite, thorace, elytris apice abdomineque rufis. L. 2 m. Pérou. — Diffère de *distinctipennis* Pic par la forme plus courte et plus convexe.

T. anobioides n. sp. Angustatus, nitidus, griseo-holosericeo pubescens, minute punctatus, rufus ; thorace breve, antice attenuato ; elytris elongatis, antice paulo impressis, externe reducte bisulcatis. Long. 2,5 m. Brésil. — Caractérisé par son faciès mimant *Anobium* F.

Trogoderma rufonotatum n. sp. [Clav.]. Oblongus, nitidus, sparse griseo pubescens et semi-hirsutus, sat minute et sparse punctatus, niger, elytris rufis, in disco et antice nigro notatis, membris rufis. L. 2,3 m. Pérou. — Caractérisé par sa particulière coloration élytrale.

T. submarginatum n. sp., de la R. Argentine, voisin du précédent, est noir en dessus avec une bordure rousse assez large s'effaçant en avant des élytres, le thorax est court et large, la forme plus parallèle, le dessus déprimé, la ponctuation plus fine.

T. unifasciatum n. sp. Oblongus, parum latus, nitidus, griseo pubescens, minute parum dense punctatus, niger, elytris ante medium arcuate rufo fasciatis, membris rufis. L. 4 m. Indes. — Caractérisé par la présence d'une seule fascie rousse élytrale.

Telopes uninotatus n. sp. [Clav.]. Minutus, oblongus, postice attenuatus, griseo pubescens, nitidus, mi-

nute, elytris fortiore, sat dense punctatus, niger, elytris postice in disco rufo maculatis. L. 2 m. Afr. Or. — Caractérisé par sa petite taille et les élytres unimaculés de roux.

Attagenus amurensis n. sp. [Clav.]. Oblongus, nitidus, minute parum dense punctatus, pro parte griseo pubescens, niger, membris testaceis; thorace lateraliter et postice anguste densiore pubescente; elytris ad basin pro parte distincte sat dense pubescentibus. L. 5 m. Sibérie. — A placer près de *japonicus* Reit.

A. sikkimensis n. sp. Oblongus, nitidus, parum pubescens, niger, elytris membrisque rufis, thorace lateraliter subarcuato, minute punctato, elytris sat latis, parum elongatis, postice attenuatis, antice paulo depressis, minute sat sparse punctatis. L. 5 m. Indes. — Diffère de *rufithorax* Pic par la forme plus élargie, le thorax foncé.

A. insignatus n. sp. Oblongus, nitidus, minute punctatus, uniformiter parum dense luteo pubescens, rufus, capite aliquot obscuriore. L. 4-4,5 m. Abyssinie. — Diffère au moins de *dichrous* Roth. par le thorax roux.

A. Madoni n. sp. Oblongus, minutus, dense et uniformiter luteo pubescens, nigro-olivaceus, elytris apice rufis aut olivaceis, membris rufis. L. 2-2,5 m. Sénégal. — Voisin de *Donckieri* Pic, en diffère par le revêtement uniforme.

A. unifasciatus n. sp. Elongatus, subparallelus, paulo sparse griseo pubescens et fusco hirsutus, dense punctatus, parum nitidus, niger, elytris ante medium reducte, rufo fasciatis. L. 4 m. Afr. Au¹e. — Caractérisé par la présence d'une seule fascie rousse élytrale.

A. apicalis n. sp. Oblongus, nitidus, niger, elytris fulvo aut griseo pubescentibus, ad basin griseo subfas-

ciatis, anguste et sinuate griseo bifasciatis, apice paulo rufescentibus ; thorace fulvo aut griseo pubescente. L. 3 m. Erythrée. — A placer près de *fasciatopunctatus* Reit.

A. asmaranus n. sp., de l'Erythrée, voisin du précédent, a l'avant-corps densément pubescent de gris, les élytres ont deux larges fascies grises, la première sinuée remonte sur la suture et entoure l'écusson, la 2^e subtransversale s'unit en partie à une macule apicale de même pubescence, les membres sont testacés.

Hemirhopalum elongatum n. sp. [Clav.]. Elongatus, postice attenuatus, parum nitidus, griseo pubescens, niger, membris rufis, L. 4 m. Brésil. — Voisin de *testaceipes* Pic, élytres plus longs et nettement atténués.

H. curtum n. sp. Latus et curtus, postice attenuatus, nitidus, ater ; thorace breve et lato, lateraliter marginato ; elytris latis, brevibus, sparse punctatis. L. 3 m. Bolivie. — Très caractérisé par sa forme robuste.

Cryptorhopalum rufum n. sp. [Clav.]. Subovatus, postice attenuatus, convexus, nitidus, paulo griseo pubescens, minute punctatus, rufus, L. 2 m. Pérou. — A placer près de *obscuriceps* Pic, qui a la tête foncée.

C. rufobrunneum mihi, de Bolivie, voisin du précédent comme coloration, mais d'un roux moins clair, avec parfois des parties un peu rembrunies, moins large et non bombé en dessus.

C. vagesignatum n. sp. Oblongus, postice paulo attenuatus, sat uniformiter luteo pubescens, parum nitidus, rufescens, membris pallidioribus, elytris vage griseo maculatis. L. 3,5 m. Brésil. — A placer près de *suturale* Pic.

C. atrum n. sp. Subovatus, nitidus, fere glaber, niger, abdomine membrisque rufis ; elytris sat fortiter puncta-

tis. L. 3,5 m. Cayenne. — Voisin de *geniculatum* Pic, plus large, élytres plus fortement ponctués, abdomen roux au lieu d'être foncé.

C. minor n. sp. Minutus, oblongus, postice attenuatus, fere glaber, sat minute punctatus, niger; thorace breve et lato, elytris paulo angustiore. L. 1,3 m. Colombie. — Voisin de *nitidissimum* Pic, forme différente.

C. semihirsutum n. sp. Oblongo-subovatus, parum convexus, dense luteo pubescens, longe fusco hirsutus, nigro-olivaceus, membris testaceis. Long. 2,5 m. Colombie. — Voisin de *cyphonoide* Sharp.

C. Cleryi v. nov. **Guerini**. Subovatus, niger, thorace lateraliter elytrisque rufis, his ad medium griseo sinuate fasciatis, ad basin late et ante apicem griseo notatis, membris rufis. L. 2 m. Pérou.

C. 4-signatum n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, minutus, elytris fortiore punctatis, griseo pubescens, niger, aliquot elytris pro parte rufis, his griseo trifasciatis, fascia secunda ad scutellum remota, et antice griseo maculatis. L. 2,5 m. Pérou. — Diffère au moins de *Cleryi* Guer. par l'apex des élytres pubescent de gris.

C. Grandjeani n. sp. Subovatus, nitidus, parum minute punctatus, griseo luteo pubescens, niger, thorace elytrisque ad basin rufis, his ad medium griseo-luteo fasciatis, ad humeros et apice griseo-luteo notatis. L. 2,5 m. Pérou. — Peut se placer près de *Cleryi* Guer., coloration et dessins des élytres différents.

C. trisignatum n. sp., du Pérou, a la forme du précédent, avec une coloration générale foncée, les élytres ont une fascie grise antérieure arquée, une transversale médiane, une anteapicale un peu oblique, les membres sont roux.

C. infasciatum n. sp. Subovatus, postice attenuatus, convexus, nitidus, minute punctatus, griseo-luteo pubescens, nigro-subæneus, membris rufis. L. 2,5 m. Pérou. — A placer près de *presuturale* Pic, très distinct par sa forme convexe.

Spermophagus Vadoni n. sp. [Bruchide]. Oblongus, antice et postice attenuatus, nitidus, fulvo pubescens, niger, abdomine rufescente, femoribus et tibiis 4 anticis rufis, spinis posticarum rufis. L. 4 m. Madagascar. — Plus grand que *diversipes* Pic, avec le revêtement du dessus plus foncé.

S. peruvianus n. sp. Oblongo-elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, diverse griseo pubescens, niger, elytris multi griseo maculatis, antennis pedibusque pro parte testaceis. L. 4,5 m. Pérou. — A placer près de *Baeri* Pic.

Bruchus (Pachybruchus) triangularifer n. sp. [Bruch.] Fere quadratus, nitidus, luteo aut griseo pubescens, niger, elytris rufis, ad basin triangulariter nigro notatis et ad suturam nigro vittatis, postice angustiore, his multi albo maculatis, membris pro majore parte testaceis. L. 2 m. Pérou. — A placer près de *mactatus* Pic.

La **v. multisparsus**, du Brésil, a les élytres noirs brièvement marqués de roux, ornés aussi de nombreuses petites macules blanches et les membres sont plus largement foncés.

Bruchidius angustior n. sp. [Bruch.]. Minutus, angustatus, nitidus, griseo et uniformiter pubescens, niger, antennis ad basin, pedibus anticis et intermediis pro parte testaceis; thorace elongato, antice attenuato; elytris thorace lationibus, elongatis; pygidio prominulo. L. 1,5 m. Brésil. — A placer près de *flavicornis* Sharp.

B. subnubilus n. sp. Minutus, elongatus, niger, supra

pro parte griseo pubescens, pro parte nigro denudatus, antennis ad basin pedibusque testaceis ; thorace elongato, antice attenuato, pupillato-punctato, supra medio anguste griseo lineato et nigro bilineato ; elytris parum elongatis, postice breve attenuatis, humeris nullis, his ad humeros, ad medium externe et apice nigro signatis. L. 2 m. Colombie. — Voisin de *scutellaris* Phi., revêtement différent, pattes claires.

B. punctopygus n. sp. Oblongo-subovatus, opacus, pro parte griseo pubescens, supra rufus, brunneo notatus, capite et infra corpore nigris, pygidio pro parte rufo, ad basin albo trisignato, membris pro majore parte rufis ; thorace conico, dense punctato, longitudine et transverse albo vittato ; elytris brevibus, multi et diverse albo signatis. L. 2 m. Bolivie. — A placer près de *lineaticollis* Sharp.

B. ruficolor n. sp., du Pérou, de coloration générale rousse, avec les antennes en majeure partie noires, a les élytres moins courts que le précédent, le thorax n'a pas de lignes blanches et le pygidium est dépourvu de signes blancs.

Eurygenius Sikorai n. sp. [Hét.]. Oblongus, griseo pubescens et hirsutus, niger, elytris metallicis, antennis rufis, ad basin obscuris, tibiis tarsisque rufis ; capite thoraceque dense punctatis, illo non breve, medio paulo dilatato, antice strangulato et sulcato ; elytris elongatis, postice paulo attenuatis, sat minute et sparse punctatis. L. 8 m. Madagascar. — Caractérisé par la forme du thorax et la coloration bicolore des membres.

Micreurygenius n. g. [Hét.]. Corpus minutus, subparallelus ; capite thorace fere applicato ; palpis brevibus, articulo ultimo securiforme, antennis brevibus et gracilibus ; thorace postice sulcato ; pedibus gracilibus.

raciés de *Macratia*, mais avec les membres non particuliers, la tête presque accolée au thorax. Genre créé pour l'espèce nouvelle suivante.

M. angustatus n. sp. *Angustatus*, nitidus, sat dense griseo pubescens, minute et dense punctatus, rufus, membris pallidioribus. L. 3,5 m. Brésil.

Copobaenus maculicollis n. sp. [Hét.]. Oblongo-elongatus, nitidus, longe hirsutus, fortiter non dense punctatus, nigro metallicus, thorace testaceo, piceo notato, pedibus pro parte testaceis. L. 6 m. Chili. — Se reconnaît facilement par son thorax bicolore.

C. ater n. sp. *Elongatus*, nitidus, hirsutus, niger ; capite fortiter et dense pupillato-punctato ; thorace pro majeure partie lève, medio bilineato-punctato, lateraliter minute et sparse punctato ; elytris elongatis, postice attenuatis, fortiter non dense punctatis, minute plicatis. L. 6 m. Chili. — Espèce caractérisée par la sculpture du thorax.

Hylophilus bicallosus n. sp. [Hét.]. Oblongo-elongatus, nitidus, breve et parum hirsute pilosus, fortiter punctatus, niger, antennis, articulo 1° obscuro excepto, tibiis anticis tarsisque testaceis, elytris post medium anguste fulvo fasciatis, ad basin fortiter impressis et in singulo rufo callosis, humeris rufis, paulo prominulis. L. 2,5 m. Brésil. — Voisin de *obscurior* Pic, s'en distingue par les callosités rousses et très marquées de la base des élytres.

H. Argentinus n. sp. *Parum elongatus*, breve griseo pubescens, parum nitidus, rufus, capite nigro, infra corpore pro parte piceo, elytris ad medium late nigro fasciatis ; antennis gracilibus, articulo ultimo apice inciso ; thorace parum lato, postice impresso ; pedibus gracilibus ; L. 2 m. R. Argentine. — Voisin de *corumbanus* Pic, ce dernier étant plus étroit, de coloration générale

testacée, sauf la tête noire avec une étroite bande brune au milieu des élytres.

H. peruvianus n. sp. Oblongus, parum nitidus, griseo pruinoso pubescens, niger, elytris brunneo-piceis, ad humeros luteo maculatis et densiore pubescentibus, pedibus pro parte testaceis, posticis piceis, his validis ; antennis sat crassis, pilosis, articulo ultimo pyriforme, apice luteo ; thorace breve et lato, minute et dense punctato. L. 2,5 m. Pérou. — Sans doute voisin de *humeralis* Chp., antennes moins robustes, thorax plus large, etc...

H. hansaensis n. sp. Oblongus, griseo-holosericeo pubescens, niger, antennis, pedibus 4 anticis, tibiis et tarsis posticis testaceis. L. 2 m. Brésil. — Voisin de *semipruinosus* Pic, en diffère par les antennes plus fortes, le thorax plus court et plus large.

Anthicus longepilosus n. sp. [Hét.]. Elongatus, nitidus, fortiter et sparse punctatus, longe hispidus, niger, elytris luteis, ad basin, apice, ad medium et externe late nigro notatis, antennis apice, femoribus et externe late nigro notatis, antennis apice, femoribus ad basin et infra corpore pro parte rufis. L. 5 m. Chine. — A placer près de *Marseuli* Pic.

A. (Acanthinus) validiceps n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, hirsutus, capite thoraceque sparse punctatis, elytris fortiter lineato punctatis, nigro-piceus, elytris luteis, ante et post medium piceo fasciatis, apice piceo notatis ; capite robusto, postice subarcuato ; antennis ad basin pedibusque testaceis. L. 2,5 m. Pérou. — Très caractérisé dans le groupe par sa tête robuste et son avant-corps brillant.

A. nitidioriceps n. sp. Oblongo-elongatus, hirsutus, nitidus, thorace subopaco, plicato, rufus, elytris piceo bifasciatis et ad apicem piceo notatis ; capite postice atte-

nuato et nitido ; antennis nigris, ad basin et apice testaceis, pedibus robustis, rufis. L. 3,5 m. Pérou. — Ressemble au précédent par sa coloration élytrale, mais élytres plus élargis, l'avant-corps non foncé et autrement sculpté.

A. Charveini n. sp., de la Guyane, ressemble au précédent par sa coloration et son faciès, s'en distingue par les antennes foncées, sauf à leur extrémité, la ponctuation forte sur l'avant-corps, celle de la tête étant moins rapprochée, le thorax brillant.

A. diosensis n. sp. Oblongus, parum nitidus, niger, antennis ad basin pedibusque testaceis ; capite robusto, postice subarcuato, fortiter sat dense punctato ; thorace breve, sat lato, antice paulo latiore, dense punctato ; elytris thorace valde latioribus, sat brevibus, apice attenuatis. L. 3 m. Pérou. — Peut se placer près de *rigidus* Laf.

Sisenecantharis n. g. [Hét.]. Capite breve, thorace latiore, oculis integris, articulo ultimo palparum subovato ; antennis elongatis et gracilibus, 11 articulatis ; thorace breve, sinuato, supra impresso ; elytris longissimis et angustatis ; pedibus elongatis et gracilibus, unguibus simplicibus. Genre établi pour l'espèce suivante, voisin de *Sisenes* Chp., s'en distingue par les yeux entiers, la forme très longue des élytres.

S. ruficeps n. sp. Elongatus, nitidus, sparse et breve griseo pubescens, niger, capite rufo, elytris nigro metallicis, dense granulosus, pedibus pro parte brunneis. L. 6 m. Chili.

Temnaspis bicoloripennis n. sp. [Phyt.]. Elongatus, rufus aut testaceus, elytris postice pallidioribus, his in disco minutissime piceo maculatis, antennis pro parte nigris ; capite inter oculos impresso-sulcato ; thorace

breve, parum lato, postice late biimpresso; elytris elongatis, subparallelis, pedibus testaceis. L. 10 m. Siam. — Voisin de *Downesi* Baly, peut être simple var. de cette espèce.

Falsocolobapsis n. g. [Megalopide]. Capite thoraceque robustis, illo lateraliter subarcuato, infra medium minute tuberculato; elytris postice valde attenuatis; femoribus posticis elytris superantibus, valde dilatatis. Genre voisin de *Sphondilia* W., mais avec le thorax tuberculé, établi pour l'espèce suivante.

F. pilosus n. sp. Oblongus, postice attenuatus, pro parte luteo aut griseo pubescens, rufus, antennis, articulo 1° excepto, capite, thorace medio elytris nigris, his ad basin rufo notatis, sutura pro parte griseo pubescens. L. 12 m. Gabon.

Sphondilia subparallela n. sp. [Phyt.]. Elongatus, subparallelus, pro parte luteo pubescens, rufus, pro parte niger, antennis ad basin pedibusque rufis; thorace nigro et rufo, robusto; elytris luteis, anguste nigro marginatis, calus humeralis brunneus, his parum elongatis, antice paulo latioribus. L. 8 m. Gabon. — Voisin de *bicoloriventris* Pic, mais élytres non sensiblement élargis aux épaules.

S. bicoloriventris v. n. **obscurior**. De plus grande taille que la forme type, élytres plus obscurcis avec les épaules fortement élargies. Gabon.

S. Thoreyi v. n. **rufa**. Subopaque et de coloration générale rousse. Haute-Sangha.

Agathomerus signatus v. n. **brevenotatus** [Phyt.]. Elytris testaceis, ad humeros breve nigro notatis. Brésil.

A. trifasciatus n. sp. Oblongus, niger, capite pro parte et thorace circa luteis, elytris nigris, pro parte luteo

marginatis, transverse et integre luteo trifasciatis : fascia prima basalis, secunda mediana recta, tertia ante-apicalis, postice medio dentata. L. 8 m. Brésil. — Voisin de *marginatus* Kl., très caractérisé par ses élytres trifasciés.

A. bifasciatus v. n. humeropunctus. Macule humérale jointe à la fascie antérieure jaune. Brésil.

A. marginatus v. n. notatithorax. Thorax orné, en outre de la bordure, de 2 macules jaunes. Brésil. La **v. reductus** mihi a la fascie antérieure jaune des élytres réduite à une macule allongée présuturale. Brésil.

Mastostethus Theresæ n. sp. [Phyt.]. Oblongus, postice paulo attenuatus, flavus aut paulo rufus, capite postice, thorace medio late, scutello elytrisque nigris, his ad basin, ad medium et ante apicem luteo sinuate fasciatis, epipleuris pro parte flavis, pectore nigro maculato, antennis, tibiis et tarsis nigris. L. 10 m. Pérou. — Diffère de *Donckieri* Pic par la bande claire de la base des élytres, le dessous moins foncé, etc.

M. 4-notatus v. n. bistrinotatus. Elytris in singulo ad medium transverse nigro trimaculatis. Pérou.

M. pallidofasciatus v. n. preapicalis. Niger, elytris ad basin et ad medium flavo fasciatis, ad apicem flavo notatis. Pérou.

M. obliquefasciatus n. sp. Oblongus, postice vage attenuatus, luteus, capite inter oculos nigro maculato, thorace in disco rufo brunnescente, scutello rufo ; elytris nigris, ad humeros et ante apicem luteo notatis, antice oblique et post medium transverse luteo fasciatis ; pedibus flavis et nigris. L. 9 m. Pérou. — Paraît voisin de *Javeti* Baly, dont il diffère au moins par les épaules marquées de clair.

M. PIC.



SciELO/MZUSP